



# Arnigel®



GEL

**Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.**

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar ARNIGEL, gel com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

**Neste folheto:**

1. O que é **ARNIGEL, gel** e para que é utilizado
2. Antes de utilizar **ARNIGEL, gel**
3. Como utilizar **ARNIGEL, gel**
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar **ARNIGEL, gel**
6. Outras informações

**1. O QUE É ARNIGEL, gel  
E PARA QUE É UTILIZADO**

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento local de apoio em traumatologia benigna em ausência de feridas (contusões, fadiga muscular) nos adultos e crianças a partir de 1 ano.

**2. ANTES DE UTILIZAR ARNIGEL,  
gel**

**Não utilizar ARNIGEL, gel**

Crianças com menos de um ano.

Se tem alergia às substâncias ativas

ou a qualquer outro componente de **ARNIGEL, gel**.

Não utilizar em mucosas, olhos, pele descamada, lesões infetadas ou feridas.

**Ao utilizar ARNIGEL, gel com outros medicamentos**

Associação desaconselhada com: Antivitaminas K.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

**Gravidez e aleitamento**

Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

**3. COMO UTILIZAR ARNIGEL, gel**

Uso cutâneo.

Aplicar logo que possível uma camada fina de **ARNIGEL, gel** na região dolorosa com uma massagem ligeira até à sua completa penetração. Renovar a aplicação 1 a 2 vezes ao dia.

**Se utilizar ARNIGEL, gel mais do que deveria**

Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

**Caso se tenha esquecido de utilizar ARNIGEL, gel**

Não utilize uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de utilizar.

**Se parar de utilizar ARNIGEL, gel**

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS**

Como todos os medicamentos, **ARNIGEL, gel** pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Possibilidade de reação alérgica sendo necessária a suspensão do tratamento.

**Comunicação de efeitos secundários**

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53  
1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

**5. COMO CONSERVAR ARNIGEL, gel**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize **ARNIGEL, gel** após o prazo de validade impresso na caixa.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

**6. OUTRAS INFORMAÇÕES****Qual a composição de ARNIGEL, gel**

Para 100 g:

Arnica montana tintura mãe ..... 7 g

Os outros componentes são: Carbomer, solução de hidróxido de sódio 10%, etanol 96% v/v, água purificada.

**Qual o aspecto de ARNIGEL, gel e conteúdo da embalagem**

Gel, bisnaga de 45 g.

**Titular da Autorização de Introdução no Mercado/Fabricante**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

França

**Este folheto foi aprovado pela última vez em 09/2013**