

Camilia®

## SOLUÇÃO ORAL EM RECIPIENTE UNIDOSE

**Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.**

**Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar CAMILIA com precaução para obter os devidos resultados.**

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, após 3 dias, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

### Neste folheto:

1. O que é **CAMILIA, solução oral** e para que é utilizado
2. Antes de tomar **CAMILIA, solução oral**
3. Como tomar **CAMILIA, solução oral**
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar **CAMILIA, solução oral**
6. Outras informações

### 1. O QUE É CAMILIA, solução oral E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nas perturbações atribuídas ao crescimento dos primeiros dentes (dores, irritabilidade, face vermelha, diarreia).

### 2. ANTES DE TOMAR CAMILIA, solução oral

#### Não tome CAMILIA

Se o seu filho é alérgico às substâncias ativas ou a qualquer outro componente de CAMILIA.

#### Tome especial cuidado com CAMILIA

- Não o instile no olho.
- Não o injete.
- Antes de usar este medicamento, deve lavar as mãos.

#### Ao tomar CAMILIA com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se o seu filho estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

### 3. COMO TOMAR CAMILIA, solução oral

#### Posologia

Uma unidose, 2 a 3 vezes por dia.


O tratamento não deve exceder os 3 dias.

Na persistência dos sintomas para além dos 3 dias, deverá consultar o seu médico.

#### Via e modo de administração

Via oral.

Consulte o diagrama para saber usar o recipiente unidose.



1- Abrir a saqueta de alumínio.



2- Destacar um recipiente unidose.





**3-** Abrir o recipiente unidose rodando a extremidade.



**4-** Verter o conteúdo do recipiente unidose na cavidade bucal da criança, mantendo a criança em posição sentada.

**5-** Fechar cuidadosamente a saqueta contendo os outros recipientes dobrando o lado aberto.

A fim de administrar sempre uma solução estéril, deve usar um recipiente unidose novo em cada nova utilização. Não deve armazenar um recipiente aberto. O recipiente unidose deve ser rejeitado após a sua utilização.

**Se der ao seu filho mais CAMILIA do que deveria:** Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter aconselhamento.

**Caso se tenha esquecido de dar ao seu filho CAMILIA:** Não dê uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

**Se parar de dar ao seu filho CAMILIA:** Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, **CAMILIA** pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

##### Comunicação de efeitos secundários

Se o seu filho tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 - 1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

#### 5. COMO CONSERVAR CAMILIA, SOLUÇÃO ORAL

Manter fora do alcance e da vista das crianças. Não utilize **CAMILIA** após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

**Antes da abertura da saqueta:** este medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

**Após a abertura da saqueta:** armazenar os recipientes unidose intactos no interior da saqueta.

##### Após a abertura do recipiente unidose:

- O produto deve ser usado imediatamente.
- Rejeitar o recipiente unidose depois de usado.
- Não armazenar o produto para uso posterior.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

#### 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

##### Qual a composição de **CAMILIA**

Por um recipiente unidose 1 ml:

- **As substâncias ativas são :** Chamomilla vulgaris 9 CH (333.3 mg), Phytolacca decandra 5 CH (333.3 mg), Rheum 5 CH (333.3 mg).

- **O outro componente** é água purificada.

##### Qual o aspecto de **CAMILIA** e conteúdo da embalagem

1 ml de solução em recipiente unidose. Uma caixa contém 10, 20 ou 30 recipientes unidose.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

##### Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricantes

##### Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

**BOIRON** - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - França

##### Fabricante:

**BOIRON** - ZAC des Frênes - 1, rue Edouard Buffard - 77144 Montévrain - França

**Este folheto foi aprovado pela última vez em 09/2013**