

# Sedatif PC<sup>®</sup>

## COMPRIMIDOS

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.**

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

### O que contém este folheto:

1. O que é **SEDATIF PC, comprimidos** e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar **SEDATIF PC, comprimidos**
3. Como tomar **SEDATIF PC, comprimidos**
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar **SEDATIF PC, comprimidos**
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O QUE É SEDATIF PC, comprimidos E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em estados ansiosos e emotivos ligeiros: ansiedade, hipersensibilidade emocional e irritabilidade, perturbações ligeiras do sono devido a esses estados, para pessoas sob stress, crianças agitadas e pessoas idosas. Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

### 2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR SEDATIF PC, comprimidos

#### **Não tome SEDATIF PC, comprimidos**

Se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou qualquer outro com-

ponente de SEDATIF PC, comprimidos (indicados na secção 6).

#### **Advertências e precauções**

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Para crianças até aos 6 anos: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar.

#### **Outros medicamentos e SEDATIF PC, comprimidos**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

#### **Gravidez e aleitamento**

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

#### **SEDATIF PC, comprimidos contém sacarose, lactose.**

### 3. COMO TOMAR SEDATIF PC, comprimidos

Via oral.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico

ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

**Adultos e crianças:** Chupar 2 comprimidos, 3 vezes ao dia. Deixe derreter os comprimidos na boca.

Para crianças até aos 6 anos: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar.

**Se tomar mais SEDATIF PC, comprimidos do que deveria**

Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

**Caso se tenha esquecido de tomar SEDATIF PC, comprimidos**

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

**Se parar de tomar SEDATIF PC, comprimidos**

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### **4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS**

Como todos os medicamentos, SEDATIF PC, comprimidos pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

**Comunicação de efeitos secundários**

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos  
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice>.

[seramhomepage](http://seramhomepage)

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

#### **5. COMO CONSERVAR SEDATIF PC, comprimidos**

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize SEDATIF PC, comprimidos após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

#### **6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Qual a composição de SEDATIF PC, comprimidos**

Para um comprimido de 300 mg:  
Aconitum napellus ..... 6 CH ..... 0,5 mg  
Atropa belladonna ..... 6 CH ..... 0,5 mg  
Calendula officinalis ..... 6 CH ..... 0,5 mg  
Chelidonium majus ..... 6 CH ..... 0,5 mg  
Abrus precatorius ..... 6 CH ..... 0,5 mg  
Viburnum opulus ..... 6 CH ..... 0,5 mg

Os outros componentes são: sacarose, lactose, estearato de magnésio

**Qual o aspeto de SEDATIF PC, comprimidos e conteúdo da embalagem**

Comprimido de 300 mg.

Caixa com 40 ou 90 comprimidos

**Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

França

**Este folheto foi aprovado pela última vez em 12/2015.**



BOIRON®